



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

سازمان غذا و دارو

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ...

موضوع: هماهنگی جهت استفاده از فاکتور ۷ در درمان خونریزیهای مامایی

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید کاهش مرگ مادران یکی از مهمترین نیازهای توسعه جوامع می باشد و تلاش در جهت ارتقای سلامت این گروه پرخطر از تعهدات همه مسئولین به شمار می رود. اطلاعات جمع آوری شده از نظام مراقبت مرگ مادری در کشور بیانگر آن است که خونریزیهای حین و پس از زایمان همچنان یکی از علل عمده و قابل اجتناب فوت مادران می باشد و این امر ضرورت استفاده از کلیه روشهای پیشگیری و درمانی برای کنترل این عارضه را نشان می دهد. از جمله این اقدامات، استفاده از فاکتورهای انعقادی در کنترل خونریزیهای شدید و مقاوم به درمان یا ناشی از اختلالات انعقادی است.

به همین منظور شرایط و مقدار استفاده از فاکتور ۷ نوترکیب (rFVIIa) در درمان عارضه فوق توسط اداره سلامت مادران، اعضای کمیته کشوری و اداره پیوند و بیماریهای خاص تهیه شده که پیوست می باشد. جهت تسریع در درمان و با توجه به محدودیت استفاده از این دارو در مواردی غیر از درمان بیماران هموفیلی، مقتضی است در مواردی که طبق مشاوره و تایید متخصص هماتولوژی (یا داخلی) برای نجات جان مادر نیاز به استفاده از فاکتور ۷ نوترکیب وجود دارد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از هماهنگی با کارشناس محترم بیماریهای خاص و مسئولین مراکز درمان هموفیلی، این دارو در دسترس تیم درمانی مادر قرار گرفته و در درخواستهای بعدی جایگزین گردد. مقتضی است این بخشنامه و گردش کار پیوست، به اطلاع متخصصین زنان، هماتولوژی، داخلی، مسئولین و سوپروایزر بیمارستانها، کارشناس محترم بیماریهای خاص و مسئولین مراکز درمانی هموفیلی قرار گیرد.

دکتر سید حسن امامی رضوی
معاون درمان

دکتر احمد شیبانی
معاون وزیر و رئیس سازمان

رونوشت:

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

جناب آقای دکتر عقیقی معاون محترم اجرایی و رییس اداره پیوند و بیماریهای خاص

گرددش کار استفاده از فاکتور هفت فونر کيب (rFVIIa) برآی کنترل خونریزی پس از زایمان

